

# Валемидин®

Капли для приема внутрь спиртовые в виде прозрачной жидкости от желтовато-коричневого до зеленовато-коричневого цвета, с характерным запахом; при хранении допускается помутнение с последующим выпадением аморфного осадка.

## Владелец регистрационного удостоверения

ЕВРОМЕД (Россия)

## Регистрационный номер

ЛСР-000057

## Латинское название

Valemidin

## Действующее вещество

валериана (Valerian), дифенгидрамин (diphenhydramine), боярышника плоды (Crataegus fruit), трава пустырника (Leonuri herba), мята перечная (Peppermint)

## АТХ

N05CM Снотворные и седативные препараты другие

## Фармакологическая группа

Седативное средство

## Нозологическая классификация (МКБ-10)

F40.. Фобические тревожные расстройства (в т.ч. агорафобия, социальные фобии)

F45.3 Соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы

F48.0 Неврастения

## Состав

Капли для приема внутрь спиртовые в виде прозрачной жидкости от желтовато-коричневого до зеленовато-коричневого цвета, с характерным запахом; при хранении допускается помутнение с последующим выпадением аморфного осадка.

25 мл

валерианы настойка

8.3 мл

пустырника настойка

8.3 мл

боярышника настойка

4.2 мл

мяты перечной настойка

4.2 мл

дифенгидрамин (димедрол)

25 мг

25 мл - флаконы темного стекла (1) с крышкой-капельницей - пачки картонные.

## Описание лекарственной формы

Капли для приема внутрь спиртовые в виде прозрачной жидкости от желтовато-коричневого до зеленовато-коричневого цвета, с характерным запахом; при хранении допускается помутнение с последующим выпадением аморфного осадка.

## Фармакологические свойства

Оказывает седативное и спазмолитическое действие.

## Показания

неврозы;нейроциркуляторная дистония по гипертоническому типу.

## Противопоказания

выраженные нарушения функции печени;выраженные нарушения функции почек;артериальная гипотензия;брадикардия (менее 55 уд./мин);острая сердечная недостаточность;хроническая сердечная недостаточность;возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены);повышенная чувствительность к компонентам препарата.С осторожностью следует назначать препарат при алкоголизме, черепно-мозговой травме, заболеваниях головного мозга.

## Способ применения и дозы

Принимают внутрь, предварительно разведя в небольшом количестве воды, за 30 мин до еды.

Взрослым назначают по 30-40 капель 3-4 раза/сут.

Курс лечения составляет 10-15 дней. Проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача, но не ранее чем через 1-1.5 мес.

## Побочные действия

Со стороны пищеварительной системы: редко - диспепсия; при длительном применении - сухость во рту. Прочие: аллергические реакции.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются или отмечаются любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, пациенту следует сообщить об этом врачу.

## Особые указания

Содержание абсолютного этилового спирта в максимальной разовой дозе для взрослых (40 капель) составляет 0.58 г, в максимальной суточной дозе для взрослых (160 капель) - 2.3 г.

Влияние на способность к управлению транспортными средствами и механизмами

Содержит дифенгидрамин и этанол, поэтому в период применения необходимо воздерживаться от занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

## **Форма выпуска**

капли д/приема внутрь спиртовые: фл. 25 мл с крышкой-капельницей

## **Производитель**

ФАРМАМЕД (Россия) или АВЗ С-П (Россия) или КИРОВСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА (Россия)

## **Условия выпуска из аптек**

Без рецепта.