

Хилак форте

Капли для приема внутрь в виде прозрачного или слегка мутного раствора желтовато-коричневого цвета с характерным кисловатым карамелеподобным запахом.

Владелец регистрационного удостоверения

ratiopharm (Германия)

Регистрационный номер

ЛП-(000100)-(РГ-RU)

Латинское название

Hylak forte

Действующее вещество

международное непатентованное наименование не присвоено (non appropriated), международное непатентованное наименование не присвоено (non appropriated), международное непатентованное наименование не присвоено (non appropriated), международное непатентованное наименование не присвоено (non appropriated)

АТХ

A07FA Противодиарейные микроорганизмы

Фармакологическая группа

Противодиарейное средство

Нозологическая классификация (МКБ-10)

A02.. Другие сальмонеллезные инфекции
A09.. Другой гастроэнтерит и колит инфекционного и неуточненного происхождения
K29.. Гастрит и дуоденит
K30.. Функциональная диспепсия (нарушение пищеварения)
K52.. Другие неинфекционные гастроэнтериты и колиты
K59.0 Запор
K59.1 Функциональная диарея
K63.8 Другие уточненные болезни кишечника
L20.8 Другие атопические дерматиты (нейродермит, экзема)
L50.. Крапивница
R14.. Метеоризм и родственные состояния (в т.ч. вздутие живота, отрыжка)

Состав

Капли для приема внутрь в виде прозрачного или слегка мутного раствора желтовато-коричневого цвета с характерным кисловатым карамелеподобным запахом.

100 мл

водный субстрат продуктов обмена веществ *Escherichia coli* DSM 4087*

24.9481 г

водный субстрат продуктов обмена веществ *Enterococcus faecalis* DSM 4086*

12.4741 г

водный субстрат продуктов обмена веществ *Lactobacillus acidophilus* DSM 4149*

12.4741 г

водный субстрат продуктов обмена веществ *Lactobacillus helveticus* DSM 4183*

49.896 г

* субстраты содержат лактозу.

Вспомогательные вещества: натрия фосфат гептагидрат - 1.159 г, дикалия фосфат - 1.265 г, молочная кислота - 2.5-6.25 г, фосфорная кислота концентрированная - 0.352 г, калия сорбат - 0.1135 г, лимонной кислоты моногидрат - 0.0322 г, вода - до 100 мл.

1.1 мл - саше (15) - пачки картонные×. 1.1 мл - саше (30) - пачки картонные×. 1.1 мл - саше (60) - пачки картонные×. 2.2 мл - саше (15) - пачки картонные×. 2.2 мл - саше (30) - пачки картонные×. 2.2 мл - саше (60) - пачки картонные×. 30 мл - флаконы темного стекла (1) с пробкой-капельницей - пачки картонные×. 100 мл - флаконы темного стекла (1) с пробкой-капельницей - пачки картонные×.

× дополнительно могут быть нанесены защитные наклейки.

Описание лекарственной формы

Капли для приема внутрь в виде прозрачного или слегка мутного раствора желтовато-коричневого цвета с характерным кисловатым карамелеподобным запахом.

Фармакологические свойства

Естественная физиологическая микрофлора кишечника может быть значительно нарушена путем таких внешних воздействий, как терапия антибиотиками, облучение, операции на желудке, а также вследствие неподходящего и непривычного питания, изменения воды, смены климата и других условий.

Хилак форте регулирует равновесие кишечной микрофлоры и нормализует ее состав. Благодаря содержанию в составе препарата продуктов обмена нормальной микрофлоры, Хилак форте способствует восстановлению нормальной микрофлоры кишечника биологическим путем и позволяет сохранить физиологические и биологические функции слизистой оболочки кишечника.

Входящая в состав препарата биосинтетическая молочная кислота и ее буферные соли восстанавливают нормальное значение кислотности в ЖКТ, независимо от того повышенная или пониженная кислотность у пациента.

На фоне ускорения развития нормальных симбионтов кишечника под действием препарата Хилак форте нормализуется естественный синтез витаминов группы В и К. Содержащиеся в Хилак форте короткоцепочечные летучие жирные кислоты обеспечивают восстановление поврежденной микрофлоры кишечника при инфекционных заболеваниях ЖКТ, стимулируют регенерацию эпителиальных клеток кишечной стенки, восстанавливают нарушенный водно-электролитный баланс в просвете кишки.

Имеются данные о том, что Хилак форте усиливает защитные функции организма благодаря стимуляции иммунного ответа.

При применении Хилака форте отмечается ускорение выведения сальмонелл у грудных детей после сальмонеллезного энтерита, что обусловлено стимуляцией роста ацидофильной анаэробной флоры и ее последующим антагонистическим воздействием на сальмонеллы.

Показания

нарушения физиологической флоры тонкого и толстого кишечника (во время и после лечения антибиотиками или сульфаниламидами, лучевой терапии); синдром недостаточности пищеварения, диспепсия; диарея, метеоризм, запоры; гастроэнтерит, колит; синдром старческого кишечника (хронические, атрофические гастроэнтериты); расстройства со стороны ЖКТ, вызванные сменой климата; гипо- и ацидные состояния; энтерогенные заболевания желчного пузыря и печени; аллергические кожные заболевания (крапивница, эндогенно обусловленная хроническая экзема); сальмонеллез в стадии реконвалесценции (в т.ч. у детей грудного возраста).

Противопоказания

повышенная чувствительность к компонентам препарата; дефицит лактазы/изомальтазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

Способ применения и дозы

Хилак форте принимают внутрь до или во время приема пищи, разбавляя в небольшом количестве жидкости, исключая молоко.

Препарат назначают 3 раза/сут.

Взрослым препарат назначают по 40-60 капель (2.2-3.3 мл) на прием; детям - по 20-40 капель (1.1-2.2 мл) на прием; младенцам - по 15-30 капель на прием.

У младенцев рекомендуется использовать препарат во флаконах.

После улучшения состояния суточная доза может быть уменьшена наполовину.

Побочные действия

Побочные реакции до настоящего времени не наблюдались.

Со стороны пищеварительной системы: возможны запор, диарея.

Аллергические реакции: возможны кожная сыпь, зуд, крапивница.

Хилак форте хорошо переносится пациентами любого возраста.

Передозировка

Никаких специальных мероприятий, за исключением обычного медицинского наблюдения, не требуется.

Особые указания

Не рекомендуется принимать препарат одновременно с молоком и молочными продуктами.

Влияние на способность к управлению транспортными средствами и механизмами

Препарат не влияет на способность управлять транспортом или заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

капли д/приема внутрь: саше 1.1 мл или 2.2 мл 15, 30 или 60 шт.; фл. 30 мл или 100 мл

Производитель

Merckle (Германия)

Условия выпуска из аптек

Без рецепта.

Срок годности препарата Хилак форте

Срок годности препарата в саше - 2 года. Срок годности препарата во флаконах - 4 года; после вскрытия флакона - 6 недель.

Условия хранения препарата Хилак форте

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.